

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 2017 ГОДА

### ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВИЧ

---

К июню 2017 г. 20,9 миллиона людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии.

В 2016 году общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 [30,8–42,9] миллиона человек.

В 2016 году число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,8 [1,6–2,1] миллиона.

В 2016 году число людей, умерших от сопутствующих СПИДУ болезней, составило 1 [0,83–1,2] миллион.

С начала эпидемии 76,1 [65,2–88,0] миллиона человек заразились ВИЧ.

С начала эпидемии 35,0 [28,9–41,5] миллиона человек умерли от сопутствующих СПИДУ болезней.

---

#### Люди, живущие с ВИЧ

- В 2016 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 [30,8–42,9] миллиона человек:
  - 34,5 [28,8–40,2] миллиона взрослых
  - 17,8 [15,4–20,3] миллиона женщин (старше 15 лет)
  - 2,1 [1,7–2,6] миллиона детей (в возрасте до 15 лет)

#### Люди, живущие с ВИЧ и получающие лечение в рамках антиретровирусной терапии

- К июню 2017 г. 20,9 [18,4–21,7] миллиона человек, живущих с ВИЧ, получали лечение в рамках антиретровирусной терапии, что выше показателей за 2015 г. и за 2010 г., составивших 17,1 [15,1–17,8] млн и 7,7 [6,8–8,0] млн. соответственно.
- В 2016 году около 53% [39–65%] всех людей, живущих с ВИЧ, получили доступ к лечению.
  - Около 54% [40–65%] взрослых в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, и только 43% [30–54%] детей в возрасте 0–14 лет получили доступ к лечению.
- В 2016 году около 76% [60–88%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, получили доступ к лечению с применением антиретровирусных препаратов с целью предотвращения передачи вируса плоду.

#### Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией

- В 2016 году во всем мире зарегистрировано 1,8 [1,6–2,1] миллиона новых случаев заражения ВИЧ.
- В 2016 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, по оценкам, снизился на 11% относительно 2010 года, с 1,9 [1,6–2,1] млн до 1,7 [1,4–1,9] млн.
- В 2016 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 47% относительно 2010 года, с 300 000 [230 000–370 000] до 160 000 [100 000–220 000].

### **Смертность вследствие СПИДа**

- Показатель смертности вследствие СПИДа снизился на 48% относительно пикового показателя 2005 года.
  - В 2016 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней составило 1 [0,83–1,2] миллион. Для сравнения в 2005 году этот показатель составлял 1,9 [1,7–2,6] миллиона человек и 1,5 [1,3–1,7] миллиона человек в 2010 году.

### **ВИЧ/Туберкулез**

- Среди людей, живущих с ВИЧ, ведущей причиной смертности остается туберкулез, на который приходится около одной трети случаев смерти, связанных со СПИДом.
- В 2015 году, по оценкам, общемировой показатель случаев заболевания туберкулезом составил 10,4 миллиона, в том числе 1,2 миллиона [11%] среди людей, живущих с ВИЧ.
- Смертность от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, в период с 2005 по 2015 годы сократилась на 33%.
  - Однако почти 60% [57%] случаев заболевания туберкулезом среди людей, живущих с ВИЧ, не были диагностированы, что привело к 390 000 случаям смерти от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, в 2015 году.

### **Инвестиции**

- По состоянию на конец 2016 года было выделено 19,1 млрд долл. США на борьбу со СПИДом в странах с низким и средним уровнями дохода.
- В 2016 году внутренние ресурсы составляли 57% от общего объема ресурсов, выделенных на борьбу с ВИЧ в странах с низким и средним уровнями дохода.
- По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на борьбу со СПИДом в странах с низким и средним уровнями дохода потребуется 26,2 млрд долл. США, а в 2030 году — 23,9 млрд долл. США.

## **РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВИЧ ЗА 2016 ГОД**

### **Страны Восточной и Южной Африки**

- В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки **число людей, живущих с ВИЧ** составило **19,4** [17,8–21,1] миллиона.

- **Женщины и девочки** составляют более половины **[59%]** от общего числа людей, живущих с ВИЧ, в странах Восточной и Южной Африки.
- На страны Восточной и Южной Африки приходится почти **43% общемирового числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекций**.
- В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки число **новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией** составило **790 000** [710 000–870 000].
  - В период с 2010 по 2016 годы число новых случаев **заражения ВИЧ-инфекцией снизилось на 29%**.
- В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки **420 000** [350 000–510 000] человек **умерли от сопутствующих СПИДу болезней**.
  - В период с 2010 по 2016 годы показатель **смертности вследствие СПИДа** в регионе уменьшился на **42%**.
- В странах Восточной и Южной Африки **11,7 млн** человек получали лечение в рамках антиретровирусной терапии, **60%** [48–68%] из всех людей, живущих с ВИЧ в регионе, в 2016 году.
  - **67%** [54–76%] взрослых женщин (в возрасте 15 лет и старше) и **51%** [41–58%] взрослых мужчин получали лечение в рамках антиретровирусной терапии в странах Восточной и Южной Африки в 2016 году.
  - То есть **шесть из десяти человек** жителей Восточной и Южной Африки получают лечение в рамках антиретровирусной терапии.
- В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей** составило **77 000** [52 000–110 000].
  - С 2010 года число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций среди детей в регионе сократилось на **56%**.

#### **Азиатско-Тихоокеанский регион**

- В 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, живущих с ВИЧ, составило **5,1** [3,9–7,2] миллиона.
- В 2016 году, по оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций в регионе составило **270 000** [190 000–370 000].
  - В период с 2010 по 2016 годы число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций уменьшилось на **13%**.
- В 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило **170 000** [130 000–220 000].
  - В период с 2010 по 2016 годы показатель **смертности вследствие СПИДа** в регионе уменьшился на **30%**.
- В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель охвата лечением среди людей, живущих с ВИЧ, составил **47%** [31–69%].
- По оценкам, в 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе **2,4** [2,1–2,5] **миллиона человек** получили **доступ к антиретровирусной терапии**.
- В 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей** составило **15 000** [7700–26 000].

- С 2010 года число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций среди детей в регионе сократилось на **38%**.

### Страны Западной и Центральной Африки

- В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки число людей, живущих с ВИЧ, составило **6,1 [4,9–7,6] миллиона**.
  - В регионе **женщины** составляют **56%** от общего числа людей, живущих с ВИЧ.
- В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки, по оценкам, **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией** составило **370 000 [270 000–490 000]**.
  - **Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось на 9%** в период с 2010 по 2016 годы.
- В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки **310 000 [220 000–400 000]** человек **умерли от сопутствующих СПИДу болезней**.
  - С 2010 по 2016 годы число смертей вследствие СПИДа в регионе **упало на 21%**.
- В странах Западной и Центральной Африки **2,1 миллиона человек получали лечение в рамках антиретровирусной терапии, 35% [24-44%]** от всех людей, живущих с ВИЧ в регионе, в 2016 году.
- В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей** составило **60 000 [35 000–89 000]**.
  - С 2010 года **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей сократилось на 33%** в регионе.

### Латинская Америка

- В 2016 году в Латинской Америке **число людей, живущих с ВИЧ**, составило **1,8 [1,4–2,1] миллиона**.
- В 2016 году, по оценкам, **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией** в регионе составило **97 000 [79 000–120 000]**.
  - Показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией не изменился за период с 2010 по 2016 годы.
- В 2016 году в Латинской Америке число людей, **умерших от сопутствующих СПИДу болезней** составило **36 000 [28 000–45 000]**.
  - В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель **смертности вследствие СПИДа** уменьшился на **12%**.
- В 2016 году в Латинской Америке **показатель охвата лечением** составил **58% [42–72%]** среди всех людей, живущих с ВИЧ.
- В 2016 году **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей** в Латинской Америке составило **1800 [1300–2400]**.

### Карибский бассейн

- В 2016 году в Карибском бассейне число людей, живущих с ВИЧ, составило **310 000 [280 000–350 000]**.

- В 2016 году, по оценкам, **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией** в регионе составило **18 000** [15 000–22 000].
- В 2016 году в Карибском бассейне число людей, **умерших от сопутствующих СПИДу болезней**, составило **9400** [7300–12 000].
  - В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель **смертности вследствие СПИДа** упал на **28%**.
- В 2016 году в Карибском бассейне **показатель охвата лечением** составил **52%** [41–60%] среди людей, живущих с ВИЧ.
- В 2016 году **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей** в Карибском бассейне составило менее **1000** [<1000–1000].

#### **Ближний Восток и Северная Африка**

- В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки **число людей, живущих с ВИЧ** составило **230 000** [160 000–380 000].
- В 2016 году, по оценкам, **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией** в регионе составило **18 000** [11 000–39 000].
  - **Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось на 4%** в период с 2010 по 2016 годы.
- В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки число людей, **умерших от сопутствующих СПИДу болезней**, составило **11 000** [7700–19 000].
  - В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель **смертности вследствие СПИДа** увеличился на **19%**.
- В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки **показатель охвата лечением** составил лишь **24%** [15–41%] среди людей, живущих с ВИЧ.
- В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей составило **1400** [<1000–3300].

#### **Восточная Европа и Центральная Азия**

- В 2016 году в странах Восточной Европы и Центральной Азии **число людей, живущих с ВИЧ**, составило **1,6** [1,4–1,7] миллиона.
- В 2016 году, по оценкам, **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией** в регионе составило **190 000** [160 000–220 000].
  - **Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией выросло на 60%** в период с 2010 по 2016 годы.
- В 2016 году в странах Восточной Европы и Центральной Азии **40 000** [32 000–49 000] человек **умерли от сопутствующих СПИДу болезней**.
- В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель **смертности вследствие СПИДа** увеличился на **27%**.
- В Восточной Европе и Центральной Азии показатель охвата лечением среди людей, живущих с ВИЧ, составил всего **28%** [22–32%].

#### **Западная и Центральная Европа и Северная Америка**

- В 2016 году в странах Западной и Центральной Европы и в Северной Америке **число людей, живущих с ВИЧ** составило, **2,1** [2–2,3 млн] миллиона.
- В 2016 году, по оценкам, **число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией** в регионе составило **73 000** [68 000–78 000].
- В 2016 году в странах Западной и Центральной Европы и в Северной Америке **число людей, умерших вследствие СПИДа**, составило **18 000** [15 000–20 000].

В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель **смертности вследствие СПИДа** **увеличился на 32%**.

## Глобальные данные по ВИЧ

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016/*Юне 2017
<b>Люди, живущие с ВИЧ</b>	<b>27,7 млн</b> [23,2 млн – 32,3 млн]	<b>31,0 млн</b> [26,0 млн – 36,3 млн]	<b>33,2 млн</b> [27,6 млн – 39,2 млн]	<b>34,3 млн</b> [28,5 млн – 40,3 млн]	<b>34,9 млн</b> [29,0 млн – 40,9 млн]	<b>35,5 млн</b> [29,5 млн – 41,6 млн]	<b>36,1 млн</b> [30,2 млн – 42,2 млн]	<b>36,7 млн</b> [30,8 млн – 42,9 млн]
<b>Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией (всего)</b>	<b>3,0 млн</b> [2,6 млн – 3,4 млн]	<b>2,5 млн</b> [2,2 млн – 2,8 млн]	<b>2,2 млн</b> [1,9 млн – 2,4 млн]	<b>2,1 млн</b> [1,8 млн – 2,3 млн]	<b>2,0 млн</b> [1,7 млн – 2,3 млн]	<b>2,1 млн</b> [1,9 млн – 2,4 млн]	<b>1,9 млн</b> [1,6 млн – 2,2 млн]	<b>1,8 млн</b> [1,6 млн – 2,1 млн]
<b>Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией (в возрасте 15+)</b>	<b>2,5 млн</b> [2,2 млн – 2,9 млн]	<b>2,1 млн</b> [1,8 млн – 2,3 млн]	<b>1,9 млн</b> [1,6 млн – 2,1 млн]	<b>1,8 млн</b> [1,6 млн – 2,0 млн]	<b>1,8 млн</b> [1,5 млн – 2,0 млн]	<b>1,7 млн</b> [1,5 млн – 2,2 млн]	<b>1,7 млн</b> [1,5 млн – 2,0 млн]	<b>1,7 млн</b> [1,4 млн – 1,9 млн]
<b>Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией (в возрасте 0–14)</b>	<b>460 000</b> [370 000– 540 000]	<b>430 000</b> [340 000– 510 000]	<b>300 000</b> [230 000– 370 000]	<b>270 000</b> [250 000– 190 000]	<b>220 000</b> [160 000– 280 000]	<b>190 000</b> [130 000– 260 000]	<b>170 000</b> [110 000– 240 000]	<b>160 000</b> [100 000– 220 000]
<b>Смертность вследствие СПИДа</b>	<b>1,5 млн</b> [1,2 млн – 1,8 млн]	<b>1,9 млн</b> [1,7 млн – 2,2 млн]	<b>1,5 млн</b> [1,3 млн – 1,7 млн]	<b>1,3 млн</b> [1,1 млн – 1,5 млн]	<b>1,2 млн</b> [1,0 млн – 1,4 млн]	<b>1,1 млн</b> [0,94 млн – 1,3 млн]	<b>1,1 млн</b> [0,88 млн – 1,3 млн]	<b>1,0 млн</b> [0,83млн – 1,2 млн]
<b>Люди, получающие лечение в рамках антиретровирусной терапии</b>	<b>685 000</b> [600 000– 710 000]	<b>2,056 млн</b> [1,8 млн – 2,1 млн]	<b>7,7 млн</b> [6,8 млн – 8,0 млн]	<b>11,2 млн</b> [9,8 млн – 11,6 млн]	<b>13,1 млн</b> [11,6 млн – 13,7 млн]	<b>15,1 млн</b> [13,3 млн – 15,7 млн]	<b>17,1 млн</b> [15,1 млн – 17,8 млн]	<b>19,5 млн</b> [17,2 млн – 20,3 млн]] / <b>*20,9 млн</b> [18,4 млн – 21,7 млн]
<b>Ресурсы, выделенные на борьбу с ВИЧ (в странах с низким и средним уровнями дохода)</b>	<b>4,8 млрд долл. США*</b>	<b>9,4 млрд долл. США*</b>	<b>15,9 млрд долл. США*</b>	<b>18,8 млрд долл. США*</b>	<b>19,5 млрд долл. США**</b>	<b>19,2 млрд долл. США**</b>	<b>19,0 млрд долл. США**</b>	<b>19,1 млрд долл. США**</b>

\*Включая страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2012 года.

\*\*Включая страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2013 года.

## Региональные данные за 2016 г.

Регион	Число людей, живущих с ВИЧ (всего) 2016 г.	Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией 2016 г.			Показатель смертности вследствие СПИДа (всего) 2016 г.	Общее число людей, получающих лечение в рамках антиретровирусной терапии 2016 г.	Общее число людей, получающих лечение в рамках антиретровирусной терапии (к июню 2017 г.)
		Всего	В возрасте 15+	В возрасте 0–14			
Страны Восточной и Южной Африки	19,4 млн [17,8–21,1 млн]	790 000 [710 000–870 000]	710 000 [630 000–790 000]	77 000 [52 000–110 000]	420 000 [350 000–510 000]	11,7 млн [10,3–12,1 млн]	12,5 млн [11,0 млн – 13,0 млн]
Азиатско-Тихоокеанский регион	5,1 млн [3,9–7,2 млн]	270 000 [190 000–370 000]	250 000 [180 000–380 000]	15 000 [7700–26 000]	170 000 [130 000–220 000]	2,4 млн [2,1–2,5 млн]	2,5 млн [2,2 млн – 2,6 млн]
Страны Западной и Центральной Африки	6,1 млн [4,9–7,6 млн]	370 000 [270 000–490 000]	310 000 [220 000–410 000]	60 000 [35 000–89 000]	310 000 [220 000–400 000]	2,1 млн [1,9– 2,2 млн]	2,3 млн [2,0 млн – 2,4 млн]
Латинская Америка	1,8 млн [1,4–2,1 млн]	97 000 [79 000–120 000]	96 000 [78 000–120 000]	1 800 [1 300–2 400]	36 000 [28 000–45 000]	1,0 млн [896 000–1 059 000]	1,1 млн [937 000–1,1 млн]
Карибский бассейн	310 000 [280 000–350 000]	18 000 [15 000–22 000]	17 000 [14 000–21 000]	<1000 [<1000–1000]	9400 [7 300–12 000]	162 000 [143 000–169 000]	170 000 [150 000–177 000]
Ближний Восток и Северная Африка	230 000 [160 000–380 000]	18 000 [11 000–39 000]	17 000 [10 000–36 000]	1400 [<1000–3300]	11 000 [7700–19 000]	54 400 [47 800–56 500]	58 400 [51 400–60 700]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,6 млн [1,4–1,7 млн]	190 000 [160 000–0–]	190 000 [160 000–220 000]	—*	40 000 [32 000–49 000]	434 000 [382 000–452 000]	474 000 [417 000–493 000]



		220 000]					
<b>Западная и Центральная Европа и Северная Америка</b>	<b>2,1 млн</b> [2 млн – 2,3 млн]	<b>73 000</b> [68 000 – 78 000]	<b>72 000</b> [67 000– 78 000]	—*	<b>18 000</b> [15 000– 20 000]	<b>1,7 млн</b> [1,5 –1,7 млн]	<b>1,7 млн</b> [1,5 млн –1.8 млн ]

\*На момент публикации данные отсутствовали.

## Региональная антиретровирусная терапия в 2016 году

	Процент взрослых (старше 15 лет), живущих с ВИЧ и получающих лечение в рамках антиретровирусной терапии	Процент детей (в возрасте 0—14 лет), живущих с ВИЧ и получающих лечение в рамках антиретровирусной терапии	Процент беременных женщин, получающих лечение с применением антиретровирусных препаратов с целью предотвращения передачи вируса плоду
Страны Восточной и Южной Африки	61% [49–69%]	51% [37–63%]	89% [71–>95%]
Азиатско-Тихоокеанский регион	47% [31–68%]	40% [25–64%]	35% [17–59%]
Страны Западной и Центральной Африки	36% [25–46%]	22% [13–29%]	50% [36–64%]
Латинская Америка	58% [42–72%]	54% [39–67%]	75% [64–88%]
Карибский бассейн	52% [41–60%]	52% [40–63%]	74% [65–84%]
Ближний Восток и Северная Африка	24% [15–41%]	27% [18–48%]	20% [15–41%]
Восточная Европа и Центральная Азия	27% [21–31%]	—*	—*
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	78% [64–87%]	—*	—*
Во всем мире	54% [40–65%]	43% [30–54%]	76% [60–88%]

\*На момент публикации данные отсутствовали.

### Контакты

Отдел по глобальной информационно-просветительской и коммуникационной работе | +41 22 791 1697 | [communications@unaids.org](mailto:communications@unaids.org)

Дополнительная информация доступна по адресу: [aidsinfo.unaids.org](http://aidsinfo.unaids.org)